

Steckbrief – Buntspecht Lösung



Name: Buntspecht (Wissenschaftlich: *Dendrocopos major*)

Klasse: Vögel (Ordnung: Spechtvögel)

Größe: ca. 22 cm bis 23 cm Körperlänge (Spannweite ca. 34 cm bis 39 cm)

Gewicht: 60 g bis 90 g

Alter: In Freiheit ca. 5 bis 10 Jahre

Aussehen: Kontrastreiches, schwarz-weißes Gefieder; auffällig große, weiße Schulterflecken; leuchtend scharlachrote Unterschwanzdecken; stützende, steife Schwanzfedern

Geschlechtsmerkmale: Sichtbarer Geschlechtsdimorphismus; Männchen besitzen einen roten Genickfleck, Weibchen haben einen komplett schwarzen Kopf; Jungvögel (Juvenile) sind an einer durchgehend roten Kopfplatte erkennbar

Nahrung: Allesfresser (Omnivor) mit saisonalem Schwerpunkt; im Sommer primär xylobionte Insekten und deren Larven (aus Totholz); im Winter Samen von Koniferen (Kiefer/Fichte), Nüsse und Beeren; selten als Nesträuber (Eier und Jungvögel)

Lebensraum: Sehr anpassungsfähig; lichte Laub-, Nadel- und Mischwälder, Altholzbestände, Parks und strukturreiche Gärten

Verbreitung: Paläarktisch (weit verbreitet über ganz Eurasien, von Westeuropa bis Japan und Teilen Nordafrikas)

Natürliche Feinde: Greifvögel (Habicht, Sperber, Wanderfalke); Nesträuber wie der Baummarder oder Waschbär; Konkurrenz um Bruthöhlen durch den Star

Nachwuchs: Eine Jahresbrut im Frühjahr (April/Mai); Eiablage von 4–7 reinweißen Eiern in einer selbst gezimmerten Baumhöhle; Brutdauer nur ca. 11–13 Tage; Jungvögel sind Nesthocker

Besonderheiten: Spezifischer Schädelaufbau mit schwammartigem Knochengewebe als Gehirn-Stoßdämpfer; extrem lange, elastische Zunge mit Widerhaken und klebrigem Speichel; Nutzung von „Spechtschmieden“ (Rindenspalten) zum Aufmeißeln von Zapfen und Nüssen

Verhalten: Streng tagaktiver Standvogel; ruckartiges Aufwärtsklettern an Stämmen in Spiralbahnen; charakteristischer, rasanter Trommelwirbel (beide Geschlechter) zur Revierabgrenzung und Partneranlockung; wichtiger Schlüsselorganismus im Wald durch die Schaffung von Höhlen für andere Tierarten